

Lactoangin®

FORTE



SPRAY DO GARDŁA O SMAKU MIĘTY

WYRÓB MEDYCZNY

OPIS WYROBU

Lactoangin® Forte jest wyrobem medycznym o unikalnym składzie przeznaczonym do wspomagania leczenia wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych infekcji gardła i migdałków podniebiennych u dzieci po ukończeniu 12. roku życia i dorosłych.

Lactoangin® Forte to 100% naturalnych składników aktywnych.

Lactoangin® Forte zawiera **aktywny supernatant probiotyczny** - postbiotyk, który tworzą związki naturalnie produkowane przez żywe bakterie kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*. W skład supernatantu wchodzi głównie kwasy organiczne tj. mlekowy i octowy. Supernatant obniża pH w miejscu aplikacji, dzięki czemu działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Ponadto, wyrób zawiera **ekstrakt z porostu islandzkiego**, który powleka błonę śluzową gardła, tworząc warstwę ochronną przed czynnikami drażniącymi i łagodząc stan zapalny. Mentol oraz olejek miętowy zmniejszają ból i podrażnienia błony śluzowej gardła, pozostawiając uczucie chłodu i świeżości; dodatkowo wykazują działanie antyseptyczne. **Glicerol** nawilża gardło zatrzymując wilgoć w miejscu aplikacji.

Lactoangin® Forte stosuje się w celu:

- wspomagania leczenia stanów zapalnych gardła i migdałków podniebiennych wywołanych przez wirusy, bakterie, grzyby lub zakażenia mieszane,
- łagodzenia bólu i zaczerwienienia gardła oraz migdałków podniebiennych,
- łagodzenia uczucia pieczenia, suchości i drapania w gardle, dzięki czemu zmniejszony zostaje odruch kaszlu,
- nawilżenia śluzówki gardła.

Lactoangin® Forte przywraca równowagę mikrobiomu gardła. Prawidłowy mikrobiom odgrywa kluczową rolę w ochronie przed niekorzystnymi drobnoustrojami i w zapobieganiu rozwojowi chorób.

W badaniach potwierdzono wysoki profil bezpieczeństwa wyrobu.

SKŁAD

Supernatant probiotyczny bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*, mentol, olejek miętowy, porost islandzki i substancje pomocnicze: woda oczyszczona, glicerol, glikol propylenowy, aromaty naturalne, sorbinian potasu, guma ksantanowa, polisorbat 20, sukraloza.

DAWKOWANIE

Dzieci po ukończeniu 12. roku życia i dorośli: 2-3 dawki preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed każdym użyciem wyrobu należy dokładnie umyć rurkę aplikatora.
2. Wstrząsnąć przed użyciem.
3. Unieść aplikator poprzez przekręcenie go na bok.
4. Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę w celu napełnienia aplikatora i uzyskania prawidłowego rozpylenia.
5. Umieścić aplikator w ustach, skierować jego wylot na gardło i nacisnąć pompkę w celu uwolnienia dawki preparatu. Czynność powtórzyć odpowiednią ilość razy.

OSTRZEŻENIA

Ze względów higienicznych zaleca się używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie określono bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego. W przypadku nasilenia objawów w trakcie stosowania wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.

Wyrób przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu bezpośrednim w temperaturze pokojowej (15–25°C), w suchym miejscu. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

OPAKOWANIE

Butelka z aplikatorem zawierająca 250 dawek, w kartoniku z instrukcją używania.

OKRES WAŻNOŚCI WYROBU

2 lata



Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
BIOMED Spółka Akcyjna, Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
Tel.: + 48 12 37 69 200 Fax: + 48 12 37 69 205
informacjanaukowa@biomed.pl www.biomed.pl

DATA OPRACOWANIA / AKTUALIZACJI

2020-12



Wytwórca



Użyć do



Numer serii



Zajrzyj do
instrukcji
używania



Niesterylny



Ograniczenie
dopuszczalnej
temperatury