


LACTOANGIN®

WYRÓB MEDYCZNY



SPRAY DO JAMY USTNEJ I GARDŁA

OPIS PRODUKTU

Spray **Lactoangin®** jest specjalistycznym wyrobem medycznym przeznaczonym do wspomagania leczenia infekcji górnych dróg oddechowych (jama ustna, gardło). **Lactoangin®** nawilża, koi, łagodzi ból i pokrywa miejsca chorobowo zmienione warstwą ochronną ułatwiającą regenerację. Nie zawiera chemicznych składników odkażających i wysuszających śluzówkę jamy ustnej.

Lactoangin® zawiera metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*, głównie kwas mlekowy, octowy, inne kwasy organiczne oraz mentol i olejek miętowy, przez co naturalnie wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddechowych (jama ustna, gardło).

Ponadto **Lactoangin®** ułatwia przywrócenie równowagi mikrobiologicznej w gardle i jamie ustnej, co zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy, powstawania płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł oraz niweluje nieprzyjemny oddech.

SKŁAD

Składnikami **Lactoangin®** są metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*, mentol, olejek miętowy i substancje pomocnicze: glicerol, glikol propylenowy, aromat cytrynowy naturalny, sorbinian potasu, guma ksantanowa, sukraloza oraz woda.

Lactoangin® stosuje się w celu:

- wspomagania leczenia infekcji jamy ustnej i gardła, w tym kandydozy (drożdżycy),
- łagodzenia bólu gardła,
- nawilżania jamy ustnej i gardła.

Ponadto pomocniczo w stanach **zaburzenia równowagi mikroflory** jamy ustnej i gardła w celu:

- niwelowania nieprzyjemnego oddechu,
- zapobiegania próchnicy,
- zapobiegania tworzenia się płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł.

DAWKOWANIE

Dzieci powyżej 3. roku życia do ukończenia 6. roku życia:

1 dawka preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli:

2-3 dawki preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Można go aplikować u dzieci powyżej 3. roku życia, natomiast u dzieci poniżej 3. roku życia po konsultacji z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wstrząsnąć przed użyciem.
2. Unieść aplikator poprzez przekręcenie go na bok.
3. Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę w celu napełnienia aplikatora i uzyskania prawidłowego rozpylenia.
4. Umieścić aplikator w ustach, skierować jego wylot na obszar w jamie ustnej lub gardle i nacisnąć pompkę w celu uwolnienia dawki preparatu.
Czynność powtórzyć odpowiednią ilość razy.

OSTRZEŻENIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

W czasie ciąży i karmienia piersią preparat stosować po konsultacji z lekarzem.

Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

Nie stosować z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.

Wyrób przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli po zastosowaniu preparatu pojawią się jakiegokolwiek niepokojące objawy, tj. pieczenie, nasilenie bólu itp. należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu bezpośrednim w temperaturze pokojowej (15 - 25°C), w suchym miejscu. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

OPAKOWANIE

Butelka z aplikatorem zawierająca 30 g preparatu, w kartoniku z instrukcją używania.

OKRES WAŻNOŚCI WYROBU

2 lata



Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek

BIOMED S.A.

Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków

tel. + 48 12 37 69 200

e-mail: informacjanaukowa@biomed.pl

www.biomed.pl

DATA OPRACOWANIA / AKTUALIZACJI

2015-06/2023-04



Wytwórca



Użyć do



Numer serii



Zajrzyj do instrukcji
używania



Niesterylny



Ograniczenie
dopuszczalnej
temperatury